



**World Cancer Research Fund International**

# 10 RACCOMANDAZIONI PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI

<p>MANTIENI IL PESO NELLA NORMA</p>	<p>MUOVITI DI PIU'</p>	<p>MANGIA PIU' CEREALI INTEGRI, LEGUMI, VERDURE E FRUTTA</p>	<p>LIMITA ZUCCHERI E GRASSI SATURI</p>
<p>LIMITA LA CARNE ROSSA ED EVITA LA CARNE CONSERVATA</p>	<p>LIMITA FORTEMENTE L'ALCOL</p>	<p>MANGIA MENO SALE</p>	
<p>NON UTILIZZARE INTEGRATORI PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI</p>	<p>ALLATTA I TUOI BAMBINI</p>	<p>DOPO IL TRATTAMENTO, CHI SI E' GIA' AMMALATO DOVREBBE SEGUIRE LE STESSE RACCOMANDAZIONI</p>	

**CANCER PREVENTION**

## **STILE DI VITA PER LA PREVENZIONE DEI TUMORI**

### **Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro (WCRF) 2007**

- 1) **Mantenersi snelli per tutta la vita.** Per conoscere se il proprio peso è in un intervallo accettabile, è utile calcolare l'Indice di massa corporea (BMI = peso in Kg diviso per l'altezza in metri elevata al quadrato: ad esempio, una persona che pesa 70 kg ed è alta 1,74 ha un BMI =  $70 / (1,74 \times 1,74) = 23,1$ ), che dovrebbe tendere al valore minimo dell'intervallo considerato normale (fra 18,5 e 24,9 secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità).
- 2) **Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni.** In pratica è sufficiente un impegno fisico pari a una camminata veloce per almeno mezz'ora al giorno; man mano che ci si sentirà più in forma, però, sarà utile prolungare l'esercizio fisico fino ad un'ora o praticare uno sport o un lavoro più impegnativo. L'uso dell'auto per gli spostamenti e il tempo passato a guardare la televisione sono i principali fattori che favoriscono la sedentarietà nelle popolazioni urbane.
- 3) **Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed evitare il consumo di bevande zuccherate.** Sono generalmente ad alta densità calorica i cibi industrialmente raffinati, precotti e preconfezionati, che contengono elevate quantità di zucchero e grassi, quali i cibi comunemente serviti nei fast food. Si noti la differenza fra "limitare" ed "evitare". Se occasionalmente si può mangiare un cibo molto grasso o zuccherato, ma mai quotidianamente, l'uso di bevande gassate e zuccherate è invece da evitare, anche perché forniscono abbondanti calorie senza aumentare il senso di sazietà.
- 4) **Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi di provenienza vegetale, con cereali non industrialmente raffinati e legumi in ogni pasto e un'ampia varietà di verdure non amidacee e di frutta.** Sono raccomandate almeno cinque porzioni al giorno tra verdure e frutta (per circa 600 g); si noti fra le verdure non devono essere considerate le patate.
- 5) **Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di carni conservate.** Le carni rosse comprendono le carni ovine, suine e bovine, compreso il vitello. Il consumo di tali carni non è infatti raccomandato, ma per chi è abituato a mangiarne si raccomanda di non superare i 500 grammi la settimana. Si noti la differenza fra il termine "limitare" (per le carni rosse) ed "evitare" (per le carni conservate, comprendenti ogni forma di carni in scatola, salumi, prosciutti, wurstel).
- 6) **Limitare il consumo di bevande alcoliche.** Per chi ne consuma si raccomanda di limitare la quantità ad un bicchiere di vino (da 120 ml) al giorno per le donne e due per gli uomini, solamente durante i pasti. La quantità di alcool contenuta in un bicchiere di vino è circa pari a quella contenuta in una lattina di birra e in un bicchierino di distillato o di liquore.
- 7) **Limitare il consumo di sale (non più di 5 g al giorno) e di cibi conservati sotto sale. Evitare cibi contaminati da muffe (in particolare cereali e legumi).** Assicurarsi quindi del buono stato di conservazione dei cereali e dei legumi che si acquistano ed evitare di conservarli in ambienti caldi ed umidi.
- 8) **Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essenziali attraverso il cibo.** Di qui l'importanza della varietà. L'assunzione di supplementi alimentari/integratori (vitamine o minerali) per la prevenzione del cancro è invece sconsigliata.
- 9) **Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi.**
- 10) **Nei limiti dei pochi studi disponibili sulla prevenzione delle recidive, le raccomandazioni per la prevenzione alimentare del cancro valgono anche per chi si è già ammalato.**

**COMUNQUE NON FARE USO DI TABACCO**